

Betegtájékoztató – Ambuláns műtét előtt

Kedves Betegünk!

Az Ön műtétjére bőrgyógyászati javaslat alapján kerül sor.

Jóindulatú elváltozás esetén takarékos bőrkimetszést alkalmazunk.

Amennyiben **rosszindulatúság gyanúja** merül fel, az **onkológiai elveknek megfelelően** történik a beavatkozás.

A végleges diagnózist minden esetben a **szövetteni vizsgálat** adja meg, ezért **minden eltávolított szövetrészt** laboratóriumba küldünk.

Tudnivalók a műtét kapcsán:

- **Véralvadásgátló vagy vérlemezkeszempertő befolyásoló gyógyszerek** szedése esetén azok szüneteltetése válhat szükségessé. Ennek megítélése minden esetben **egyénilag történik**.
- A műtét napján **reggelizzen a megszokott módon**, és szokásos gyógyszereit is **vegye be**.

A műtét menete:

- Érkezés után a műtőasztalon **helyi érzéstelenítő injekciót** kap (általában **Lidocain**, ritkán, érzékenység esetén **Marcain**).
- Az érzéstelenítés beállta után kezdődik a műtét, melyet **steril körülmények között** végzünk. A beavatkozás során **enyhe húzó vagy nyomó érzés** előfordulhat, de **éles fájdalmat nem érezhet**.
- A műtét során sor kerül az elváltozás eltávolítására és a seb varratokkal való egyesítésére. A varrat típusa a **seb hosszától, mélységétől, elhelyezkedésétől és a szövetek állapotától** függ – minden esetben egyénilag döntjük el.
- A sebet **steril kötéssel fedjük**.
Kb. **15–20 perces megfigyelés** után – panaszmentesség esetén – **otthonába távozhat**.
- **Kísérő jelenléte javasolt**.
A teljes folyamat az érkezéstől a távozásig **körülbelül 1 órát vesz igénybe**.

A műtét utáni időszak:

- **Sebgyógyulási zavar** ritkán fordul elő (kb. 2–3%), ezért köztes kontroll általában **nem szükséges**.
- **Varratszedés** a műtétet követően **két hét múlva esedékes**.
- Otthonában **2–4 naponta kötéscsere** javasolt. A seb kezelése **Betadine oldattal**, majd **steril, légáteresztő fedőkötéssel** történjen.
Fontos: **a sebet víz ne érje**, ha a kötés elázik, azonnal cserélni kell!

Figyelmeztető jelek esetén:

Amennyiben az alábbi tüneteket tapasztalja:

- kifejezett fájdalom a seb körül,
- vörös elszíneződés,
- váladékozás,
- láz,

kérjük, **előzetes telefonos egyeztetés után** keresse fel rendelőnket!

Szövettani lelet:

A varratszedést követően a **szövettani leletet**:

- személyesen rendelőnkben, vagy
- az **EESZT** rendszerből (TAJ-szám alapján), esetleg
- egyedi kód segítségével honlapunkon keresztül is elérheti.

Ezt követően kérjük, **keresse fel a beutaló orvost**, aki a lelet alapján dönt a további teendőkről.